

Catálogo de Produtos



www.curantur.com.br



Remédios
Ecologicamente
Corretos



Indústria de Medicamentos Veterinários

Fábrica de Medicamentos com orientação na medicina da similitude, buscando preservar a natureza, o bem estar animal, um ambiente livre de contaminantes.

Nosso comprometimento é com um homem livre, confiante na sua natureza transformadora.

Princípios ativos podem ser medicamentos, e se completarem o indivíduo em sua plenitude curadora, serão remédios que contemham alento do corpo e da alma, a Curantur tem como princípio a busca de remédios que atendam a necessidade dos seres vivos com toda complexidade de sua natureza.

A Curantur é planejada para atender as necessidades dos indivíduos sendo cada remédio estudado, em cada fase da vida animal atuando do nascimento a plenitude, do sofrimento ao acalanto, em toda complexidade dos sintomas físicos e mentais, cada medicamento foi eleito depois de dez anos de experiência clínica e escolhidos por sua magnitude curadora com respeito aos animais e reconhecimento da importância deles na produção, no lar, na natureza, o respeito a vida nos torna virtuosos, de efeito legal "curador da vida animal" na grande arquitetura do mundo.

A Curantur veio em auxílio na transformação de um mundo animal com melhor qualidade, respeito a etologia e dignidade pela vida.

Remédios
Ecologicamente
Corretos

Linha  **Lactans**

Linha  **Fecunditas**

www.curantur.com.br

Linha  **Locus**

Linha  **Lactans**

ESTA LINHA FOI DESENVOLVIDA VISANDO A PRODUÇÃO DE LEITE E PROTEÇÃO DA GLÂNDULA MAMÁRIA COM REMÉDIOS QUE ATUAM DESDE A LIMPEZA DA GLÂNDULA ATÉ A DESESTRUTURA DE COLÔNIAS DE BACTÉRIAS RESISTENTES.



Lac Símile

 **REDUZ** α
CCS do Leite

 **AUMENTA** α
PRODUÇÃO leiteira

Indicações: Medicamento preventivo nas mastites subclínicas, reduzindo o aparecimento de CMT positivo e CCS elevada, e proteção da glândula mamária. Estimula as defesas naturais intrínsecas e extrínsecas.

Ação: Atua preventivamente na proteção da glândula mamária, estimulando a produção de leite e as defesas naturais. É o remédio indispensável em atividade leiteira intensa onde indivíduos passam por várias fases da produção. É recomendado para animais em produção e longevas, ou com proles grandes. Pode atuar para manter o pico de lactação.

Posologia:

Bovinos: 25 g duas vezes ao dia por 5 a 7 dias ou 25 g uma vez ao dia por 12 dias.

Equinos: 25 g duas vezes ao dia por 12 dias.

Ovinos e caprinos: 15 g duas vezes ao dia por 5 a 7 dias. Casos de 50% do rebanho apresentando CMT positivo e CCS elevada usar até 12 dias.

Período de carência: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DE BOVINOS, OVINOS, CAPRINOS E EQUINOS TRATADOS.

O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O CONSUMO DO LEITE DOS BOVINOS, OVINOS E CAPRINOS TRATADOS.

Cuidados de armazenamento: Conserve o produto na embalagem original, em local fresco e arejado, ao abrigo do sol, longe de odores fortes e fontes de radiação eletromagnética. Conservar a embalagem fechada.

"Produto cadastrado no MAPA, sem comprovação oficial de sua eficácia, toxicidade e estabilidade".

Apresentação: Sólida 1,5 kg, 5 kg e 10 kg

**0% DESCARTE
ZERO
DO LEITE**



Lac Sanus

 **REDUZ** α **CCS** do Leite

 **AUMENTA** α **PRODUÇÃO** leiteira

Indicações: Rebanhos com elevada CCS, nas mastites clínicas persistentes.

Ação: No combate à mastite, agindo de forma preventiva nas infecções da glândula mamária, ativando as defesas naturais. Auxilia nos processos curativos como drenagem de mama, auxiliando na limpeza da glândula e em processos infecciosos antigos de difícil limpeza. Pode ser administrado de forma tanto preventiva como curativa. Também age como coadjuvante de antibióticos depois da limpeza da inflamação, trazendo uma cura efetiva sem massas duras na glândula por depósito de processos inflamatórios, preservando os canais sem perda de tecido mamário. Remédio de ação inteligente, proteção, prevenção e cura, não agredindo o meio e preservando ao máximo os tecidos mamários para as próximas lactações.

Posologia:

Bovinos: 25 g duas vezes ao dia por 12 dias

Equinos: 25 g duas vezes ao dia por 12 dias.

Ovinos e caprinos: 15 g duas vezes ao dia por 12 dias.

Período de carência: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DE BOVINOS, OVINOS, CAPRINOS E EQUINOS TRATADOS.

O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O CONSUMO DO LEITE DOS BOVINOS, OVINOS E CAPRINOS TRATADOS.

Cuidados de armazenamento: Conserve o produto na embalagem original, em local fresco e arejado, ao abrigo do sol, longe de odores fortes e fontes de radiação eletromagnética. Conservar a embalagem fechada.

"Produto cadastrado no MAPA, sem comprovação oficial de sua eficácia, toxicidade e estabilidade".

Apresentação: Sólida 1,5 kg e 5 kg



**0% DESCARTE
ZERO
DO LEITE**

Lac Precípulo

Indicações: Indivíduos com mastite persistente e sensíveis a bactérias infectantes ambientais e contagiosas.

Ação: Medicamento bem prescrito nos casos de sensibilidade bacteriana, em casos crônicos e agudos onde o técnico conhece a forma de atuação bacteriológica. Atua bem na sensibilização das bactérias estimulando o organismo nas defesas natas e estimulando a eliminação das bactérias, bem como a limpeza dos processos inflamatórios.

Posologia:

Bovinos: 25 g duas vezes ao dia de 5 a 10 dias.

Equinos: 25 g duas vezes ao dia de 5 a 10 dias.

Ovinos e caprinos: 15 g duas vezes ao dia de 5 a 10 dias.

Período de carência: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DE BOVINOS, OVINOS, CAPRINOS E EQUINOS TRATADOS.

O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O CONSUMO DO LEITE DOS BOVINOS, OVINOS E CAPRINOS TRATADOS.

Cuidados de armazenamento: Conserve o produto na embalagem original, em local fresco e arejado, ao abrigo do sol, longe de odores fortes e fontes de radiação eletromagnética. Conservar a embalagem fechada.

"Produto cadastrado no MAPA, sem comprovação oficial de sua eficácia, toxicidade e estabilidade".

Apresentação: Sólida 1,5 kg e 5 kg



Lac Defensis

Indicações: Mastites agudas, com aumento desproporcional da glândula mamária de forma isolada em um quarto mamário.

Ação: Mastites com manifestação aguda, medicamento específico onde se instalam mastites de forma localizada, sendo bem prescrito em casos onde temos aumento da glândula mamária de forma isolada em um quarto mamário, com crescimento e inchaço desproporcional. É um medicamento para o veterinário usar de forma precisa.

Posologia:

Bovinos: 25 g duas vezes ao dia por 12 dias.

Equinos: 25 g duas vezes ao dia por 12 dias.

Ovinos e caprinos: 15 g duas vezes ao dia por 12 dias.

Período de carência: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DE BOVINOS, OVINOS, CAPRINOS E EQUINOS TRATADOS.

O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O CONSUMO DO LEITE DOS BOVINOS, OVINOS E CAPRINOS TRATADOS.

Cuidados de armazenamento: Conserve o produto na embalagem original, em local fresco e arejado, ao abrigo do sol, longe de odores fortes e fontes de radiação eletromagnética. Conservar a embalagem fechada.

"Produto cadastrado no MAPA, sem comprovação oficial de sua eficácia, toxicidade e estabilidade".

Apresentação: Sólida 1,5 kg e 5 kg



Lac Terrarum

Indicações: Mastites crônicas e drenagem de glândulas mamárias.

Ação: Ativa processos de limpeza e drenagem da glândula mamária, sendo bem prescrito em processos crônicos, mastites difíceis de curar. Atua bem na drenagem concomitante a outros tratamentos homeopáticos. Quando o uso for com alopatia, usar antes Lac Terrarum por cinco dias e posteriormente o medicamento alopático eleito.

Posologia:

Bovinos: 25 g duas vezes ao dia por 7 dias.

Equinos: 25 g duas vezes ao dia por 7 dias.

Ovinos e Caprinos: 15 g duas vezes ao dia por 7 dias.

Período de carência: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DE BOVINOS, OVINOS, CAPRINOS E EQUINOS TRATADOS.

O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O CONSUMO DO LEITE DOS BOVINOS, OVINOS E CAPRINOS TRATADOS.

Cuidados de armazenamento: Conserve o produto na embalagem original, em local fresco e arejado, ao abrigo do sol, longe de odores fortes e fontes de radiação eletromagnética. Conservar a embalagem fechada.

"Produto cadastrado no MAPA, sem comprovação oficial de sua eficácia, toxicidade e estabilidade".

Apresentação: Sólida 1,5 kg e 5 kg



Lac Sulph

Indicações: Mastites crônicas com presença de nódulos duros nas glândulas mamárias.

Ação: Mastite com urgência em drenagens. Atua nos nódulos formados na glândula mamária por colônias bacterianas. Medicamento prescrito por médicos veterinários que usam do diagnóstico laboratorial como ferramenta de trabalho na solução das mastites contagiosas.

Posologia:

Bovinos: 25 g duas vezes ao dia por 7 dias.

Equinos: 25 g duas vezes ao dia por 7 dias.

Ovinos e Caprinos: 15 g duas vezes ao dia por 7 dias.

Período de carência: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DE BOVINOS, OVINOS, CAPRINOS E EQUINOS TRATADOS.

O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O CONSUMO DO LEITE DOS BOVINOS, OVINOS E CAPRINOS TRATADOS.

Cuidados de armazenamento: Conserve o produto na embalagem original, em local fresco e arejado, ao abrigo do sol, longe de odores fortes e fontes de radiação eletromagnética. Conservar a embalagem fechada.

"Produto cadastrado no MAPA, sem comprovação oficial de sua eficácia, toxicidade e estabilidade".

Apresentação: Sólida 1,5 kg e 5 kg



Lac Phylo

Indicações: Mastites por Staphylococcus.

Ação: Usado de forma específica em mastites por Staphylococcus, buscando uma sensibilização do agente, de forma a facilitar a atuação de outros medicamentos. Bem prescrito no caso de resistência bacteriana.

Posologia:

Bovinos: 25 g duas vezes ao dia por 7 dias.

Equinos: 25 g duas vezes ao dia por 7 dias.

Ovinos e Caprinos: 15 g duas vezes ao dia por 12 dias.

Período de carência: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DE BOVINOS, OVINOS, CAPRINOS E EQUINOS TRATADOS.

O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O CONSUMO DO LEITE DOS BOVINOS, OVINOS E CAPRINOS TRATADOS.

Cuidados de armazenamento: Conserve o produto na embalagem original, em local fresco e arejado, ao abrigo do sol, longe de odores fortes e fontes de radiação eletromagnética. Conservar a embalagem fechada.

"Produto cadastrado no MAPA, sem comprovação oficial de sua eficácia, toxicidade e estabilidade".

Apresentação: Sólida 1,5 kg e 5 kg



Lachia

Indicações: Mastites por *Escherichia coli*

Ação: Usado de forma específica em mastites por infecção de *Escherichia coli*, buscando uma sensibilização do agente de forma a facilitar a atuação de outros medicamentos no combate a infecção tanto na forma aguda como crônica.

Posologia:

Bovinos: 25 g duas vezes ao dia, por 7 dias.

Equinos: 25 g duas vezes ao dia, por 7 dias.

Ovinos e Caprinos: 15 g duas vezes ao dia, por 7 dias.

Período de carência: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DE BOVINOS, OVINOS, CAPRINOS E EQUINOS TRATADOS.

O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O CONSUMO DO LEITE DOS BOVINOS, OVINOS E CAPRINOS TRATADOS.

Cuidados de armazenamento: Conserve o produto na embalagem original, em local fresco e arejado, ao abrigo do sol, longe de odores fortes e fontes de radiação eletromagnética. Conservar a embalagem fechada.

"Produto cadastrado no MAPA, sem comprovação oficial de sua eficácia, toxicidade e estabilidade".

Apresentação: Sólida 1,5 kg e 5 kg



Linha Lactans

Hemophytus

Indicações: Batidas e lesões com sangue no leite.

Ação: Atua nas lesões internas do úbere, por edemaciação no parto e traumas por batidas, reestrutura o leite diminuindo a cor rósea devido ao rompimento de vasos e ativa a proteção da glândula mamária.

Posologia:

Bovinos: 25 g duas vezes ao dia, por 10 dias. Dose única: 150 g.

Equinos: 25 g duas vezes ao dia, por 10 dias. Dose única: 150 g

Ovinos e Caprinos: 15 g duas vezes ao dia, por 10 dias. Dose única: 100 g

Período de carência: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DE BOVINOS, OVINOS, CAPRINOS E EQUINOS TRATADOS.

O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O CONSUMO DO LEITE DOS BOVINOS, OVINOS E CAPRINOS TRATADOS.

Cuidados de armazenamento: Conserve o produto na embalagem original, em local fresco e arejado, ao abrigo do sol, longe de odores fortes e fontes de radiação eletromagnética. Conservar a embalagem fechada.

"Produto cadastrado no MAPA, sem comprovação oficial de sua eficácia, toxicidade e estabilidade".

Apresentação: Sólida 1,5 kg e 5 kg



Lacttus

Indicações: Animais de alta produção sob estresse produtivo, exauridos por invernos prolongados ou verões intensos. Usar nas trocas de estações.

Ação: Age estimulando a produção e atenuando sintomas mentais de exaustão.

Posologia:

Bovinos: dose única de 5 ml, duas vezes ao ano.

Ovinos e Caprinos: dose única de 3 ml, duas vezes ao ano.

Período de carência: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DE BOVINOS, OVINOS, CAPRINOS E EQUINOS TRATADOS.

O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O CONSUMO DO LEITE DOS BOVINOS, OVINOS E CAPRINOS TRATADOS.

Cuidados de armazenamento: Conserve o produto na embalagem original, em local fresco e arejado, ao abrigo do sol, longe de odores fortes e fontes de radiação eletromagnética. Conservar a embalagem fechada.

"Produto cadastrado no MAPA, sem comprovação oficial de sua eficácia, toxicidade e estabilidade".

Apresentação: Líquido 500 ml e 1 litro.



Linha



Fecunditas

REMÉDIOS DESENVOLVIDOS PARA AS FASES DA VIDA REPRODUTIVA, ATUAM DESDE O ANESTRO ESTIMULANDO CIOS AO PERÍODO DE SECAGEM DAS VACAS, FACILIDADE NO PARTO E INFUSÃO UTERINAS REGULANDO O PH PARA UMA IMPLANTAÇÃO DO ÓVULO, PRENHÊS POSITIVAS.



www.curantur.com.br

Virtus

Indicações: Anestro, inatividade ovariana, cistos ovarianos.

Ação: Atua em ovários inativos ativando a produção hormonal de forma natural, fazendo que o organismo seja estimulado naturalmente. Atua em cistos ovarianos, sendo bem prescrito em inatividade ovariana e estimulação de cios.

Posologia:

Bovinos: 25 g duas vezes ao dia por 12 dias. Dose única: 150 g. Repetir em 30 dias.

Equinos: 25 g duas vezes ao dia por 12 dias. Dose única: 150 g. Repetir em 30 dias.

Ovinos e caprinos: 15 g duas vezes ao dia por 12 dias.

Dose única: 100 g. Repetir em 30 dias

Período de carência: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DE BOVINOS, OVINOS, CAPRINOS E EQUINOS TRATADOS.

O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O CONSUMO DO LEITE DOS BOVINOS, OVINOS E CAPRINOS TRATADOS.

Cuidados de armazenamento: Conserve o produto na embalagem original, em local fresco e arejado, ao abrigo do sol, longe de odores fortes e fontes de radiação eletromagnética. Conservar a embalagem fechada.

"Produto cadastrado no MAPA, sem comprovação oficial de sua eficácia, toxicidade e estabilidade".

Apresentação: Sólida 1,5 kg e 5 kg



Linha  **Fecunditas**

Privus

Indicações: Indicado em casos de abortos por contaminações ambientais.

Atuação: Atua na manutenção da gestação.

Ação: Bem prescrito em casos de abortos por causas diversas. Atua na manutenção da gestação, quando os rebanhos são vacinados para doenças reprodutivas e ainda assim existem casos de abortos. Tem atividade de proteção, em rebanhos sob estresse ambiental no aborto por Neospora.

Posologia:

Bovinos: 25 g duas vezes ao dia por 12 dias. Dose única: 150 g. Repetir em 30 dias.

Equinos: 25 g duas vezes ao dia por 12 dias. Dose única: 150 g. Repetir em 30 dias.

Ovinos e Caprinos: 15 g duas vezes ao dia por 12 dias. Dose única: 100 g. Repetir em 30 dias

Período de carência: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DE BOVINOS, OVINOS, CAPRINOS E EQUINOS TRATADOS.

O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O CONSUMO DO LEITE DOS BOVINOS, OVINOS E CAPRINOS TRATADOS.

Cuidados de armazenamento: Conserve o produto na embalagem original, em local fresco e arejado, ao abrigo do sol, longe de odores fortes e fontes de radiação eletromagnética. Conservar a embalagem fechada.

"Produto cadastrado no MAPA, sem comprovação oficial de sua eficácia, toxicidade e estabilidade".

Apresentação: Sólida 1,5 kg e 5 kg



Oestrus

Indicações: Anestro, inatividade ovariana

Atuação: Atua como estimulante de ciros. Pode ser usado em animais de forma individual ou em rebanhos que estão em perfeito estado de saúde, mas com pouco estímulo tanto de forma visual como por ausência do fator macho e feromônios.

Posologia:

Bovinos: 25 g duas vezes ao dia por 12 dias. Dose única: 150 g. Repetir em 30 dias.

Equinos: 25 g duas vezes ao dia por 12 dias. Dose única: 150 g. Repetir em 30 dias.

Ovinos e Caprinos: 15 g duas vezes ao dia por 12 dias. Dose única: 100g. Repetir em 30 dias.

Período de carência: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DE BOVINOS, OVINOS, CAPRINOS E EQUINOS TRATADOS.

O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O CONSUMO DO LEITE DOS BOVINOS, OVINOS E CAPRINOS TRATADOS.

Cuidados de armazenamento: Conserve o produto na embalagem original, em local fresco e arejado, ao abrigo do sol, longe de odores fortes e fontes de radiação eletromagnética. Conservar a embalagem fechada.

"Produto cadastrado no MAPA, sem comprovação oficial de sua eficácia, toxicidade e estabilidade".

Apresentação: Sólida 1,5 kg e 5 kg



Linha  **Fecunditas**

Siccante

Indicações: Vacas com lactação persistente.

Atuação: Atua na diminuição do leite em fase de pré-secagem.

Ação: Diminui o leite facilitando o manejo e proteção de úberes no período de secagem. Bem prescrito quando usado com medicamentos intramamários, podendo ser suficiente onde o técnico conhece a bacteriologia infectante do meio e controle, atuando sozinho com plenitude.

Posologia:

Bovinos: 50 g uma vez ao dia por 6 dias. Dose única: 150 g.

Ovinos e Caprinos: 15 g uma vez ao dia por 6 dias. Dose única: 100 g

Período de carência: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DE BOVINOS, OVINOS, CAPRINOS E EQUINOS TRATADOS.

O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O CONSUMO DO LEITE DOS BOVINOS, OVINOS E CAPRINOS TRATADOS.

Cuidados de armazenamento: Conserve o produto na embalagem original, em local fresco e arejado, ao abrigo do sol, longe de odores fortes e fontes de radiação eletromagnética. Conservar a embalagem fechada.

"Produto cadastrado no MAPA, sem comprovação oficial de sua eficácia, toxicidade e estabilidade".

Apresentação: Sólida 1,5 kg e 5 kg



Parturiente

Indicações: Medicamento pré-parto. Indicado em trabalhos de parto e auxilia as parturientes de forma preventiva.

Ação: Atua no manejo das parturientes. Facilita a dilatação e lubrificação do canal e age na atonia uterina, contribuindo para evitar a retenção de placentas. Excelente atuação onde a produção está equilibrada, evitando transtornos em decorrência das distocias de parto.

Posologia:

Bovinos: 25 g duas vezes ao dia por 6 dias. Dose única: 150 g

Equinos: 25 g duas vezes ao dia por 6 dias. Dose única: 150 g

Ovinos e Caprinos: 15 g duas vezes ao dia por 6 dias. Dose única: 100 g

Período de carência: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DE BOVINOS, OVINOS, CAPRINOS E EQUINOS TRATADOS.

O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O CONSUMO DO LEITE DOS BOVINOS, OVINOS E CAPRINOS TRATADOS.

Cuidados de armazenamento: Conserve o produto na embalagem original, em local fresco e arejado, ao abrigo do sol, longe de odores fortes e fontes de radiação eletromagnética. Conservar a embalagem fechada.

"Produto cadastrado no MAPA, sem comprovação oficial de sua eficácia, toxicidade e estabilidade".

Apresentação: Sólida 1,5 kg e 5 kg



Linha  **Fecunditas**

Linha  **Lócus**

REMÉDIOS QUE ATUAM NAS LACUNAS DE REPRODUÇÃO. REMÉDIOS QUE ATUAM COMO MODIFICADORES ORGÂNICOS PARA NUTRIÇÃO, ESTIMULANDO O EQUILÍBRIO TANTO NA NUTRIÇÃO COMO NOS CASOS DE VERMINOSE ATÉ PROTETORES PARA DIARRÉIAS DE RECÉM NASCIDOS.



Creștere

Indicações: Para indivíduos em fase de crescimento, estimulando o desenvolvimento pleno das características genéticas.

Ação: Medicamento recomendado para animais em fase de crescimento. Estimula o desenvolvimento natural dos indivíduos ou em corpos coletivos como rebanhos. Estimula os processos naturais de desenvolvimento orgânico no crescimento. Desenvolvimento de tendões e queima de reservas de gordura.

Posologia:

Bovinos: 25 g uma vez ao dia por 7 dias. Repetir em 30 dias. Dose única: 150 g. Repetir em 30 dias.

Equinos: 25 g uma vez ao dia por 7 dias. Repetir em 30 dias. Dose única: 150 g. Repetir em 30 dias.

Ovinos e Caprinos: 15 g duas vezes ao dia por 7 dias. Repetir em 30 dias. Dose única: 100 g. Repetir em 30 dias.

Período de carência: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DE BOVINOS, OVINOS, CAPRINOS E EQUINOS TRATADOS.

O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O CONSUMO DO LEITE DOS BOVINOS, OVINOS E CAPRINOS TRATADOS.

Cuidados de armazenamento: Conserve o produto na embalagem original, em local fresco e arejado, ao abrigo do sol, longe de odores fortes e fontes de radiação eletromagnética. Conservar a embalagem fechada.

"Produto cadastrado no MAPA, sem comprovação oficial de sua eficácia, toxicidade e estabilidade".

Apresentação: Sólida 1,5 kg e 5 kg



Linha **Lócus**

Modificatore

Indicações: Animais com inapetência e baixa conversão alimentar, transtornos mentais como apatia.

Ação: Estimula a ingestão de alimentos. Recomendado para animais em fase reprodutiva. Estimula o consumo de forma natural, sem resíduos químicos.

Posologia:

Bovinos: 25 g duas vezes ao dia, por 5 dias. Dose única: 150 g. Repetir em 30 dias.

Equinos: 25 g duas vezes ao dia, por 5 dias. Dose única: 150 g. Repetir em 30 dias.

Ovinos e Caprinos: 15 g duas vezes ao dia, por 5 dias. Dose Única: 100 g. Repetir em 30 dias

Período de carência: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DE BOVINOS, OVINOS, CAPRINOS E EQUINOS TRATADOS.

O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O CONSUMO DO LEITE DOS BOVINOS, OVINOS E CAPRINOS TRATADOS.

Cuidados de armazenamento: Conserve o produto na embalagem original, em local fresco e arejado, ao abrigo do sol, longe de odores fortes e fontes de radiação eletromagnética. Conservar a embalagem fechada.

"Produto cadastrado no MAPA, sem comprovação oficial de sua eficácia, toxicidade e estabilidade".

Apresentação: Sólida 1,5 kg e 5 kg



Helminthe

Indicações: Animais sensíveis a verminose, ambientes com altas infestações.

Ação: Medicamento de suporte tanto para animais de companhia como de produção. Melhora a imunidade com relação aos helmintos, aumenta o intervalo entre as vermifugações com quimioterápicos.

Posologia:

Bovinos adultos: 50 g, três vezes ao ano; novilhas: 50 g, quatro vezes ao ano; terneiros: 25 g a cada 45 dias, até 6 meses de idade.

Equinos adultos: 50 g, duas vezes ao ano; jovens: 50 g, quatro vezes ao ano; neonatos até 6 meses de idade: 25 g a cada 45 dias.

Ovinos e Caprinos: 25 g a cada 60 dias, podendo ser maior o intervalo, dependo do nível de parasitismo do rebanho.

Período de carência: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DE BOVINOS, OVINOS, CAPRINOS E EQUINOS TRATADOS.

O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O CONSUMO DO LEITE DOS BOVINOS, OVINOS E CAPRINOS TRATADOS.

Cuidados de armazenamento: Conserve o produto na embalagem original, em local fresco e arejado, ao abrigo do sol, longe de odores fortes e fontes de radiação eletromagnética. Conservar a embalagem fechada.

"Produto cadastrado no MAPA, sem comprovação oficial de sua eficácia, toxicidade e estabilidade".

Apresentação: Sólida 1,5 kg e 5 kg



Linha **Lócus**

Helminthe

Líquido

Indicações: Animais sensíveis a verminose, ambientes com altas infestações.

Ação: Medicamento de suporte tanto para animais de companhia como de produção. Melhora a imunidade com relação aos helmintos, aumenta o intervalo entre as vermifugações com quimioterápicos.

Posologia:

Bovinos adultos: 5 ml, três vezes ao ano; jovens: 3 ml, 4 vezes ao ano; neonatos até 6 meses de idade: 2 ml a cada 45 dias. Equinos adultos: 5 ml, 3 vezes ao ano; jovens: 3 ml, quatro vezes ao ano; neonatos até 6 meses de idade: 2 ml a cada 45 dias.

Ovinos e caprinos adultos: 3 ml, três vezes ao ano; jovens: 2 ml, três vezes ao ano; neonatos até 6 meses de idade: 1 ml a cada 45 dias.

Período de carência: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DE BOVINOS, OVINOS, CAPRINOS E EQUINOS TRATADOS.

O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O CONSUMO DO LEITE DOS BOVINOS, OVINOS E CAPRINOS TRATADOS.

Cuidados de armazenamento: Conserve o produto na embalagem original, em local fresco e arejado, ao abrigo do sol, longe de odores fortes e fontes de radiação eletromagnética. Conservar a embalagem fechada.

"Produto cadastrado no MAPA, sem comprovação oficial de sua eficácia, toxicidade e estabilidade".

Apresentação: Líquido 500 ml e 1 litro.



Ostrearum

Indicações: Indivíduos com baixa assimilação de cálcio.

Ação: Atua na reposição de cálcio em organismos debilitados onde a troca de alimentos e as fases produtivas longas levam a desgastes orgânicos ou em animais com baixa assimilação de nutrientes.

Posologia:

Bovinos: 25 g duas vezes ao dia, por 10 dias. Dose única: 150 g. Repetir em 30 dias.

Equinos: 25 g duas vezes ao dia, por 10 dias. Dose única: 150 g. Repetir em 30 dias.

Ovinos e Caprinos: 15 g duas vezes ao dia, por 12 dias. Dose única: 100 g. Repetir em 30 dias.

Período de carência: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DE BOVINOS, OVINOS, CAPRINOS E EQUINOS TRATADOS.

O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O CONSUMO DO LEITE DOS BOVINOS, OVINOS E CAPRINOS TRATADOS.

Cuidados de armazenamento: Conserve o produto na embalagem original, em local fresco e arejado, ao abrigo do sol, longe de odores fortes e fontes de radiação eletromagnética. Conservar a embalagem fechada.

"Produto cadastrado no MAPA, sem comprovação oficial de sua eficácia, toxicidade e estabilidade".

Apresentação: Sólida 1,5 kg e 5 kg



Lócus
 Linha

Depuratum

Indicações: Para dermatites, escamações pelo e pele, parasitismo.

Ação: Destina-se à limpeza de organismos parasitados. Atua em sintomas causados por vermes gastrointestinais e parasitas cutâneos. Estimula as defesas intrínsecas e extrínsecas.

Posologia:

Bovinos adultos: 50 g três vezes ano; novilhos: 50 g quatro vezes ano; terneiros até 6 meses de idade: 25 g a cada 45 dias.

Equinos adultos: 50 g duas vezes ao ano; jovens: 50 g três vezes ao ano; neonatos até 6 meses de idade: 25 g a cada 45 dias.

Ovinos e caprinos: 25 g a cada 60 dias.

Período de carência: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DE BOVINOS, OVINOS, CAPRINOS E EQUINOS TRATADOS.

O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O CONSUMO DO LEITE DOS BOVINOS, OVINOS E CAPRINOS TRATADOS.

Cuidados de armazenamento: Conserve o produto na embalagem original, em local fresco e arejado, ao abrigo do sol, longe de odores fortes e fontes de radiação eletromagnética. Conserve a embalagem fechada.

"Produto cadastrado no MAPA, sem comprovação oficial de sua eficácia, toxicidade e estabilidade".

Apresentação: Sólida 1,5 kg e 5 kg



Bionato

Indicações: Diarréias severas e persistentes.

Ação: Recomendado para filhotes em fase de aleitamento, atuando curativamente nas diarréias neonatais, estruturando a flora intestinal e protegendo o filhote nas primeiras fases de vida. Também reduz fraqueza e apatia, atuando como fortificante e reconstituente.

Posologia:

Bovinos: 25 g duas vezes ao dia por 7 dias. Dose única: 150 g. Repetir em 30 dias.

Equinos: 25 g duas vezes ao dia por 7 dias. Dose única: 150 g. Repetir em 30 dias.

Ovinos e caprinos: 15 g duas vezes ao dia por 7 dias. Dose única: 100 g. Repetir em 30 dias.

Período de carência: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DE BOVINOS, OVINOS, CAPRINOS E EQUINOS TRATADOS.

O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O CONSUMO DO LEITE DOS BOVINOS, OVINOS E CAPRINOS TRATADOS.

Cuidados de armazenamento: Conserve o produto na embalagem original, em local fresco e arejado, ao abrigo do sol, longe de odores fortes e fontes de radiação eletromagnética. Conservar a embalagem fechada.

"Produto cadastrado no MAPA, sem comprovação oficial de sua eficácia, toxicidade e estabilidade".

Apresentação: Sólida 1,5 kg e 5 kg



Linha **Lócus**

Biolac

Indicações: No desconforto gastrointestinal, preventivo nas diarreias.

Ação: Auxilia na prevenção das diarreias após o consumo de leite, reequilibra a flora intestinal, atua no desconforto decorrente da ingestão de leite fora de temperatura e por sobrecarga.

Posologia:

Bovinos até dois meses de idade: 25 g uma vez ao dia por 7 dias.

Equinos até dois meses dias de idade: 25 g uma vez ao dia por 7 dias.

Ovinos e Caprinos até dois meses dias de idade: 15 g uma vez ao dia por 7 dias.

Período de carência: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DE BOVINOS, OVINOS, CAPRINOS E EQUINOS TRATADOS.

O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O CONSUMO DO LEITE DOS BOVINOS, OVINOS E CAPRINOS TRATADOS.

Cuidados de armazenamento: Conserve o produto na embalagem original, em local fresco e arejado, ao abrigo do sol, longe de odores fortes e fontes de radiação eletromagnética. Conservar a embalagem fechada.

"Produto cadastrado no MAPA, sem comprovação oficial de sua eficácia, toxicidade e estabilidade".

Apresentação: Sólida 1,5 kg e 5 kg



Thuya

Indicações: Verrugas

Ação: Nas verrugas, por estresse ambiental e de manejo, bem como verrugas em mamilos.

Posologia:

Bovinos: 25 g duas vezes ao dia por 12 dias. Dose única: 150 g. Repetir em 30 dias.

Equinos: 25 g duas vezes ao dia por 12 dias. Dose única: 150 g. Repetir em 30 dias.

Ovinos e caprinos: 15 g duas vezes ao dia por 12 dias. Dose única: 100 g. Repetir em 30 dias

Período de carência: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DE BOVINOS, OVINOS, CAPRINOS E EQUINOS TRATADOS.

O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O CONSUMO DO LEITE DOS BOVINOS, OVINOS E CAPRINOS TRATADOS.

Cuidados de armazenamento: Conserve o produto na embalagem original, em local fresco e arejado, ao abrigo do sol, longe de odores fortes e fontes de radiação eletromagnética. Conservar a embalagem fechada.

"Produto cadastrado no MAPA, sem comprovação oficial de sua eficácia, toxicidade e estabilidade".

Apresentação: Sólida 1,5 kg e 5 kg



Lócus
 Linha

Remédios
Ecologicamente
Corretos



(54) **3048-0646** | (54) **9610-2146**

Estrada São Roque Km 1 - Com. Nossa Senhora da Saúde - Cep 99066-120
Passo Fundo - RS - curantur@curantur.com.br

www.curantur.com.br